

www.gastroenterologos.com.mx

www.gastroenterologos.com.mx

Debido a los sedantes utilizados durante el examen, alguna persona debe acompañarlo a su casa.

Aunque usted se sienta bien después del procedimiento, su criterio y sus reflejos pueden quedar afectados por el resto del día.

www.gastroenterologos.com.mx



Colangiopancreatografía

La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, o CPRE, es una técnica especializada que se emplea para estudiar los conductos biliares dentro y fuera del hígado y los conductos del páncreas.

Durante la CPRE, el médico introduce un endoscopio a través de la boca, el esófago y el estómago hasta el interior del duodeno (primera parte del intestino delgado).

El endoscopio es un tubo delgado y flexible que permite al médico observar el interior de los intestinos. Una vez que el médico visualiza la abertura común de los conductos biliar y pancreático, pasa un catéter de plástico por medio del endoscopio hasta llegar al interior de los conductos. Luego, inyecta una sustancia de contraste en los conductos pancreáticos o biliares y procede a tomar radiografías.

Preparación

Antes del procedimiento, el paciente debe ayunar por un mínimo de seis horas (y preferiblemente de un día a otro) para garantizar que el estómago esté vacío, lo cual es necesario para optimizar el examen. Usted debe informar al médico sobre los medicamentos que toma regularmente, así como sobre cualquier alergia que pueda tener a los medicamentos.

Informe al médico si es alérgico a las drogas que contienen yodo, que incluyen la sustancia de contraste. Si bien una alergia no impide que usted pueda realizarse una CPRE, es importante que analice este tema con su médico antes del procedimiento.

Informa a su médico si padece de enfermedades cardíacas o pulmonares, o bien otras enfermedades importantes.

Es posible que el médico le administre un anestésico local en la garganta, o bien que le dé un sedante para que usted esté más cómodo. Algunos pacientes también reciben antibióticos antes del procedimiento. Usted se recuesta sobre el costado izquierdo en una mesa de rayos X. El médico le introduce el endoscopio a través de la boca, el esófago y el estómago hasta llegar al interior del duodeno. El instrumento no interfiere con la respiración, pero es posible que usted tenga una sensación de hinchazón debido al aire que es introducido a través del instrumento.

Complicaciones

La CPRE es un procedimiento bien tolerado cuando es efectuado por médicos que tengan entrenamiento y experiencia en la técnica. Si bien pueden producirse complicaciones que requieran que el paciente permanezca hospitalizado, éstas son poco frecuentes (menos del 5%). Las complicaciones pueden incluir pancreatitis (inflamación o infección del páncreas), infecciones, perforación y sangrado intestinal. Algunos pacientes pueden presentar una reacción adversa al sedante utilizado. Las complicaciones suelen manejarse sin necesidad de cirugía.

Los riesgos varían según el motivo por el cual se realice la prueba, lo que se encuentre durante el procedimiento, la intervención terapéutica que se lleve a cabo y el hecho de que un paciente tenga o no problemas de salud importantes. Los pacientes que son sometidos a una CPRE terapéutica, por ejemplo para extraer cálculos, enfrentan un mayor riesgo de complicaciones que los pacientes que se realizan una CPRE con fines de diagnóstico.

Antes de efectuar la prueba, su médico analizará la probabilidad de complicaciones en su caso.

Si usted se somete a una CPRE en forma ambulatoria, será observado para descartar complicaciones hasta que la mayoría de los efectos de la medicación hayan desaparecido.

Es posible que experimente hinchazón o evacuación de gases debido al aire introducido durante el examen. A menos que se le indique lo contrario, podrá reanudar su dieta habitual.